

TD – AN4

SOMMES ET PRODUITS

Applications directes du cours

ADC 1 Calculer les sommes suivantes :

$$\sum_{k=0}^{10} 3 \quad ; \quad \sum_{k=1}^n 5 \quad ; \quad \sum_{i=0}^3 i^3 \quad ; \quad \sum_{k=2}^5 \frac{1}{k}.$$

ADC 2 Calculer les produits suivantes :

$$\prod_{k=0}^{10} 2 \quad ; \quad \prod_{k=1}^n 5 \quad ; \quad \prod_{i=0}^3 i! \quad ; \quad \prod_{k=1}^5 \exp(k).$$

ADC 3 Calculer (on attend un résultat simplifié) avec $n \in \mathbb{N}$:

$$\frac{(n+1)!}{n!} \quad ; \quad \frac{(n+2)!}{n!} \quad ; \quad \prod_{i=1}^n \frac{i}{i+1}$$

ADC 4 Calculer, en utilisant les résultats du cours.

$$\sum_{i=10}^{20} i \quad ; \quad \sum_{k=1}^{n+1} k \quad ; \quad \sum_{k=1}^n (2k+1) \quad ; \quad 3+4+5+\dots+15.$$

ADC 5 Montrer par récurrence : $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $\sum_{k=1}^n k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$.

ADC 6 Calculer, en utilisant les résultats du cours.

$$\sum_{k=2}^{10} 2^k \quad ; \quad \sum_{k=0}^n \frac{3^k}{4^k} \quad ; \quad \sum_{k=1}^n ((-1)^k \times 2^{k+1}) \quad ; \quad \sum_{\ell=0}^n e^{\ell+1}.$$

ADC 7 Calculer, à l'aide d'un télescopage :

$$\sum_{k=0}^n ((k+1)^4 - k^4) \quad ; \quad \sum_{k=2}^n \ln\left(\frac{k+1}{k}\right).$$

ADC 8 Écrire la formule donnant $(a+b)^6$.

ADC 9 Calculer $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 2^k$.

Exercices

Exercice 1

- Démontrer que pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, $\frac{1}{k^2} - \frac{1}{(k+1)^2} = \frac{2k+1}{k^2(k+1)^2}$.
- En déduire la valeur de $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{2k+1}{k^2(k+1)^2}$.

Exercice 2 On considère, pour $n \in \mathbb{N}^*$, $S_n = \sum_{k=0}^n \frac{1}{\sqrt{k+n^2}}$.

1. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $\frac{n+1}{\sqrt{n+n^2}} \leq S_n \leq \frac{n+1}{n}$.
2. En déduire la limite de la suite $(S_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$.

Exercice 3 Pour $n \in \mathbb{N}^*$, $n \geq 2$, on considère $u_n = \sum_{k=2}^n \frac{1}{k^2}$.

1. Montrer que $(u_n)_{n \geq 2}$ est croissante.
2. Montrer que pour tout $k \in \mathbb{N}$, $k \geq 2$, on a : $\frac{1}{k^2} \leq \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}$.
3. En utilisant la propriété de croissance de la somme, montrer que $u_n \leq 1$ pour tout $n \geq 2$.
4. Justifier la convergence de $(u_n)_{n \geq 2}$.

Exercice 4 Montrer que les suites $(S_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ et $(T_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ définies pour $n \in \mathbb{N}^*$ par :

$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2} \quad \text{et} \quad T_n = S_n + \frac{1}{n}$$

sont adjacentes.

Exercice 5

1. Calculer la somme double $\sum_{\substack{1 \leq i \leq n \\ 0 \leq j \leq n}} 3^j$.
2. Calculer la somme double $\sum_{1 \leq i \leq j \leq n} 3^j$.

Pour aller plus loin

Exercice 6 Soient $a, b \in \mathbb{R}$. Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$(a-b) \sum_{k=0}^n a^k b^{n-k} = a^{n+1} - b^{n+1}.$$

Exercice 7 Calculer les sommes suivantes : $\sum_{k=1}^n k \times k!$ et $\sum_{k=1}^n \frac{k}{(k+1)!}$.

Indication : faire apparaître un télescopage ou alors deviner le résultat et le montrer par récurrence.

Exercice 8 Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note $H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$.

1. Montrer que la suite $(H_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est croissante.
2. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $H_{2n} - H_n \geq \frac{1}{2}$.
3. En déduire, en raisonnant par l'absurde, que $H_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} +\infty$.